


BOLIVIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



Incidencia
(100.000 hab.) **30,1**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**

Ocurrencia


2231

NUEVOS CASOS

1995 cutáneas (89,4%)

236 mucosas (10,6%)

ICLc



GRUPO DE EDAD

5,1% < 5 años
7,3% ≥ 5 < 10 años
87,6% > 10 años

12,4% niños
menores de 10 años



SEXO

69,3% Masculino
30,7% Feminino

44,2% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **31** provincias

43,7% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

70,8% de la población
en zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Sin información sobre
control químico del
vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
nuneztovari, *L. carrerai*
carrerai, *L. shawi*, *L.*
ayrozai, *L. yucumensis*, *L.*
llanosmartinsi, *L.*
nuneztovari anglesi



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
99,8%

Cura clínica: **99,7%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Sin información

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas