

BOLÍVIA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **32,2**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Médio**


Ocorrência

2222

NOVOS CASOS

1873 cutâneas (84,3%)

349 mucosas (15,7%)



ICLc



GRUPO DE IDADE

7,5% < 5 anos
6,8% ≥ 5 < 10 anos
85,7% > 10 anos

14,3% crianças
menores de 10 anos



SEXO

70% Masculino
30% Feminino

62,3% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **5** países
em **31** províncias

26,6% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

62,9% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
nuneztovari, *L. carrerai*
carrerai, *L. shawi*, *L.*
ayrozai, *L. yucumensis*, *L.*
llanosmartinsi, *L.*
nuneztovari anglesi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100% (**45** laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**70**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B Lipossomal

Anfotericina B
Desoxicolato