

# BOLIVIA

## Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia  
(100.000 hab.) **32,2**

Transmisión  
Indice Compuesto de  
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**


Ocurrencia

**2222**

NUEVOS CASOS

1873 cutáneas (84,3%)

349 mucosas (15,7%)



### GRUPO DE EDAD

7,5% < 5 años  
6,8% ≥ 5 < 10 años  
85,7% > 10 años

**14,3%** niños  
menores de 10 años



### SEXO

70% Masculino  
30% Feminino

**62,3%** hombres a  
más de 10 años



### FRONTERAS

Frontera con **5** países  
en **31** provincias

**26,6%** de los casos  
en las fronteras



### VIGILANCIA Y CONTROL

**62,9%** de la población  
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**  
(Programa Regional de  
Evaluación Externa  
Directa del Desempeño  
para el diagnóstico  
microscópico)



### ESPECIES DE LEISHMANIA

*L. amazonensis*  
*L. braziliensis*  
*L. guyanensis*  
*L. lainsoni*



### VECTORES LUTZOMYIA

*L. flaviscutellata*, *L.*  
*nuneztovari*, *L. carrerai*  
*carrerai*, *L. shawi*, *L.*  
*ayrozai*, *L. yucumensis*, *L.*  
*llanosmartinsi*, *L.*  
*nuneztovari anglesi*



### ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:  
**100%** (**45** laboratorios  
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**70**  
unidades de atención  
hacen el tratamiento)



### MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de  
Meglumina

Anfotericina B  
Desoxicolato

Anfotericina B Liposomal