

BOLÍVIA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **29,5**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Médio**


Ocorrência

2283

NOVOS CASOS

2052 cutâneas (89,9%)

231 mucosas (10,1%)



**ICLTc triênio
(2015-2017)**



GRUPO DE IDADE

6,6% < 5 anos
9,3% ≥ 5 < 10 anos
84,1% > 10 anos

15,9% crianças
menores de 10 anos



SEXO

68,6% Masculino
31,4% Feminino

60% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **5** países
em **31** províncias

25,3% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

69,5% da população
em áreas de transmissão

Aumento da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
nuneztovari, *L. carrerai*,
L. shawi, *L.*
ayrozai, *L. yucumensis*,
L. llanosmartinsi, *L.*
nuneztovari anglesi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100%

Cura clínica: **58,6%**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Lipossomal