

BOLIVIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **29,5**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Medio**


Ocurrencia

2283

NUEVOS CASOS

2052 cutáneas (89,9%)

231 mucosas (10,1%)



**ICLTc trienio
(2015-2017)**

8,12 - 17,24 (Muy intenso)

2,15 - 8,11 (Intenso)

0,01 - 2,14 (Alto)

-0,70 - 0,00 (Medio)

-1,05 - -0,71 (Bajo)



GRUPO DE EDAD

6,6% < 5 años
9,3% ≥ 5 < 10 años
84,1% > 10 años

15,9% niños
menores de 10 años



SEXO

68,6% Masculino
31,4% Femenino

60% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con 5 países
en 31 provincias

25,3% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

69,5% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
nuneztovari, *L. carrerai*, *L.*
carrerai, *L. shawi*, *L.*
ayrozai, *L. yucumensis*,
L. llanosmartinsi, *L.*
nuneztovari anglesi



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **58,6%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Liposomal