


BRASIL

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **17,7**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Muito
Intenso**



Ocorrência

17526

NOVOS CASOS

16708 cutâneas (95,3%)

818 mucosas (4,7%)

ICLTc triênio* (2015-2017)



*O MS reportou 1297 casos de municípios desconhecidos que não foram incluídos nos cálculos do índice composto de leishmanioses.



GRUPO DE IDADE

3,2% < 5 anos
4% ≥ 5 < 10 anos
91,8% > 10 anos
1% Não especificado

7,2% crianças
menores de 10 anos



SEXO

72,7% Masculino
27,3% Feminino

56,4% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **10**
países em **588**
municípios

16,3% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

47,6% da população
em áreas de transmissão

Estável % de LC em
menores de 10 anos em
comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni
L. lindenbergi
L. naiffi
L. shawi



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. reducta*, *L. olmeca nociva*, *L. whitmani*, *L. neivai*, *L. migonei*, *L. carrerai carrerai*, *L. intermedia*, *L. complexa*, *L. wellcomei*, *L. davisii*, *L. fischeri*, *L. pessoai*, *L. umbratilis*, *L. anduzei*, *L. ubiquitousalis*, *L. antunesi*, *L. ayrozai*, *L. squamiventris*, *L. paraensis*, *L. edwardsi*, *L. amazonensis*



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
83,1%

Cura clínica: **69,8%**

% Pacientes curados entre
tratados: **74,1%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de Meglumina

Anfotericina B Lipossomal

Anfotericina B
Desoxicolato

Isetionato de Pentamidina