

ECUADOR

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **22,6**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Medio**


Ocurrencia

1632

NUEVOS CASOS

1605 cutáneas (98,3%)

27 mucosas (1,7%)



**ICLTc trienio
(2015-2017)**



GRUPO DE EDAD

4,5% < 5 años
7,8% ≥ 5 < 10 años
87,7% > 10 años

12,3% niños
menores de 10 años



SEXO

66% Masculino
34% Femenino

59,7% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **28** cantones

18,4% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

43% de la población en
zonas de transmisión

Disminución del % de
LC en menores de 10
años en comparación a la
línea de base del 2012-
2015 (Meta del Plan de
Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. equatoriensis
L. mexicana
L. naiffi
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. ayacuchensis
L. hartmanni
L. tortura
L. trapidoi
L. cruciata



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
99,9%

Cura clínica: **99,9%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **99,9%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
desoxicolato