


GUATEMALA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



ICLc



Incidencia
(100.000 hab.) **18,2**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**

Ocurrencia
564
NUEVOS CASOS

564 cutáneas (100%)



GRUPO DE EDAD

5,3% < 5 años
6,7% ≥ 5 < 10 años
88% > 10 años

12% niños menores
de 10 años



SEXO

76,6% Masculino
23,4% Feminino

49,6% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **4** países
en **43** municipios

40,4% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

19,3% de la población
en zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Realiza el control químico
del vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. olmeca olmeca
L. ovallesi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. trapidoi



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
59,6%

Cura clínica: **27,1%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Estibogluconato de
Sódio

Isotianato de
Pentamidina

Miltefosina

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016