

GUATEMALA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **27,46**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Médio**


Ocorrência

589

NOVOS CASOS

589 cutâneas (100%)

ICLc



GRUPO DE IDADE

3,9% < 5 anos
5,1% ≥ 5 < 10 anos
91% > 10 anos

9% crianças menores
de 10 anos



SEXO

77,4% Masculino
22,6% Feminino

68,3% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **4** países
em **43** municípios

42,4% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

12,8% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. olmeca olmeca
L. ovallesi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. trapidoi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
89,8% (**36** laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **73,3%** (**20**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B Lipossomal

Anfotericina B
Desoxicolato