

GUATEMALA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **27,46**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**


Ocurrencia

589

NUEVOS CASOS

589 cutáneas (100%)

ICLc



GRUPO DE EDAD

3,9% < 5 años
5,1% ≥ 5 < 10 años
91% > 10 años

9% niños menores
de 10 años



SEXO

77,4% Masculino
22,6% Feminino

68,3% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **4** países
en **43** municipios

42,4% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

12,8% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. olmeca olmeca
L. ovallesi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. trapidoi



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
89,8% (**36** laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **73,3%** (**20**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina
Anfotericina B
Desoxicolato
Anfotericina B
Liposomal