

GUYANA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **11,21**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Medio**

Ocurrencia

21

NUEVOS CASOS

21 desconocido

(100%)

ICLTc trienio*
(2015-2017)**



* Datos en primer nivel administrativo
**El MS reportó 04 casos desde municipios desconocidos que no fueron incluidos en el cálculo del índice compuesto de leishmaniasis.



GRUPO DE EDAD

0% < 5 años
0% ≥ 5 < 10 años
100% > 10 años

0% niños menores
de 10 años



SEXO

85,7% Masculino
14,3% Femenino

85,7% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países

Informaciones sobre
las fronteras **no
disponible**



VIGILANCIA Y CONTROL

6,3% de la población en
zonas de transmisión

Disminución del % de
LC en menores de 10
años en comparación a la
línea de base del 2012-
2015 (Meta del Plan de
Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. guyanensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. umbratilis
L. anduzei
L. whitmani



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **14,3%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **13,6%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina