

MEXICO

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



Incidencia
(100.000 hab.) **6,32**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Bajo**

Ocurrencia

479

NUEVOS CASOS

478 cutáneas (99,8%)

1 mucosas (0,2%)



GRUPO DE EDAD

1,9% < 5 años
2,9% ≥ 5 < 10 años
94,8% > 10 años
0,4% Desconocido

4,8% niños menores
de 10 años



SEXO

77,9% Masculino
22,1% Feminino

59,1% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **20** municipios

10,2% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

6,26% de la población
en zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

No se realiza el control
químico del vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VECTORES LUTZOMYIA

L. ovallesi, *L. olmeca*
olmeca, *L. panamensis*,
L. ylephiletor, *L.*
diabolica, *L. deleoni*, *L.*
cruciata, *L. shannoni*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
74,1%

Cura clínica: **48.6%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas