

MÉXICO

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **5,97**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Bajo**

Ocurrencia

447

NUEVOS CASOS

444 cutáneas (99,3%)

03 mucosas (0,7%)



GRUPO DE EDAD

1,4% < 5 años
3,1% ≥ 5 < 10 años
95,5% > 10 años

4,5% niños
menores de 10 años



SEXO

81,7% Masculino
18,3% Feminino

79% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **20** municipios

24,8% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

6,13% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VECTORES LUTZOMYIA

L. ovallesi
L. olmeca olmeca
L. panamensis
L. ylephiletor
L. diabolica
L. deleoni
L. cruciata
L. shannoni



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
81,9% (**26** laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **64%**
(**4672** unidades de
atención hacen el
tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina