

MÉXICO

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **11,50**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Baixo**

Ocorrência

842
NOVOS CASOS

842 cutâneas
(100%)

ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

1,8% < 5 anos
3,2% ≥ 5 < 10 anos
95% > 10 anos

5% crianças
menores de 10 anos



SEXO

80% Masculino
20% Feminino

77% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **21** municípios

21,15% dos casos
nas fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

5,9% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VETORES LUTZOMYIA

L. ovallesi, *L. olmeca*
L. olmeca, *L. panamensis*,
L. ylephiletor, *L. gomezi*,
L. diabolica, *L. cruciata*,
anthophora, *L. shannoni*



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
87,4%

Cura clínica: **91,9%**

% Pacientes curados entre
tratados: **91,9%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina