

MÉXICO

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2018

Incidencia
(100.000 hab.) **6,31**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2016-2018) **Bajo**



Ocurrencia

576

NUEVOS CASOS

573 cutáneas (99,5%)

03 mucosas (0,5%)

ICLTc trienio
(2016-2018)



GRUPO DE EDAD

2,2% < 5 años
4% ≥ 5 < 10 años
93,6% > 10 años
0,2% no especificado

6,2% niños
menores de 10 años



SEXO

82,5% Masculino
17,5% Femenino

78,3% hombres
mayores de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **21** municipios

27,6% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

7,32% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC en
menores de 10 años en
relación con el año
anterior (Meta del Plan de
Acción 2017-2022).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VECTORES LUTZOMYIA

L. anthophora, *L. cruciata*, *L. diabolica*, *L. gomezi*, *L. hartmani*, *L. olmeca olmeca*, *L. ovallesi*, *L. panamensis*, *L. shannoni*, *L. ylephiletor*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
80,7%

Cura clínica: **61,3%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **61,7%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumine