


NICARÁGUA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2015



ICLc



Incidência
(100.000 hab.) **76,6**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Intenso**

Ocorrência

1925

NOVOS CASOS

1860 outras cutâneas
(96,7%)

36 cutâneas atípicas (1,9%)

27 mucosas (1,4%)

02 desconhecido (0,1%)



GRUPO DE IDADE

17,2% < 5 anos
15,1% ≥ 5 < 10 anos
67,7% > 10 anos

32,3% crianças
menores de 10 anos



SEXO

55,2% Masculino
44,8% Feminino

23,9% homens
acima de 20 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com 2 países
em 27 municípios

22,3% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

40,1 % da população
em zonas de transmissão

Notificação obrigatória e
individual

Sem informação sobre
o controle químico do
vetor



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. longipalpis
L. evansi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Tratamento gratuito no
sistema público de saúde

Diagnóstico de laboratório:
86,3%

Cura clínica: **91,7%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Sem informação