

NICARÁGUA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2018

Incidência
(100.000 hab.) **82,1**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2016-2018) **Muito
Intenso**

Ocorrência

3722

NOVOS CASOS

3627 cutâneas (97,4%)

60 cutânea atípica (1,6%)

35 mucosas (1%)

ICLTc triênio
(2016-2018)



GRUPO DE IDADE

11,8% < 5 anos
13,8% ≥ 5 < 10 anos
74,3% > 10 anos
0,1% não especificado

25,6% crianças
menores de 10 anos



SEXO

60,7% Masculino
39,3% Feminino

48,1% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **26** municípios

31,5% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

70,1% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em relação ao ano
anterior (Meta do Plano
de Ação 2017-2022).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. panamensis
L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. cruciata, *L. diabolica*,
L. evansi, *L. gomezi*, *L.*
longipalpis, *L.*
nuneztovari anglesi, *L.*
ovallesi, *L. panamensis*,
L. sanguinaria, *L.*
shannoni, *L. trapidoi*, *L.*
ylephiletor



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
94,8%

Cura clínica: **92%**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumine

Anfotericina B
Lipossomal