


PANAMÁ


Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



Incidencia
(100.000 hab.) **29,7**
Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Alto**

Ocurrencia
930
NUEVOS CASOS
465 cutáneas (50%)
03 mucosas (0,3%)
462 desconocido (49,7%)

ICLc



GRUPO DE EDAD

30,4% < 5 años
12,7% ≥ 5 < 10 años
56,9% > 10 años

43,1% niños
menores de 10 años



SEXO

52,6% Masculino
47,4% Feminino

22,1% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con 2 países
en 7 distritos

22% de los casos en
las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

85,9 % de la población
en zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Sin información sobre
el control químico del
vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. colombiense
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
27,8%

Cura clínica: **Sin
Información**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Desoxicolato

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas