

PANAMÁ

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2018

Incidencia
(100.000 hab.) **29,7**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2016-2018) **Medio**

Ocurrencia


1143

NUEVOS CASOS

1014 cutáneas (88,7%)

10 mucosas (0,9%)

**119 No especificadas
(10,4%)**



**ICLTc trienio
(2016-2018)**



GRUPO DE EDAD

20,6% < 5 años
13% ≥ 5 < 10 años
66,3% > 10 años
0,1% no especificado

33,6% niños
menores de 10 años



SEXO

57,4% Masculino
42,6% Femenino

41,4% hombres
mayores de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **07** distritos

17% de los casos en
las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

95% de la población en
zonas de transmisión

Disminución del % de LC
en menores de 10 años
en relación con el año
anterior (Meta del Plan de
Acción 2017-2022).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. panamensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. naiffi



VECTORES LUTZOMYIA

L. gomezi
L. olmeca bicolor
L. olmeca olmeca
L. panamensis
L. sanguinaria
L. trapidoi
L. ylephiletor



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
51,8%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumine

Anfotericina B
Desoxicolato