

PARAGUAY

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **5,60**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Bajo**


Ocurrencia

136

NUEVOS CASOS

71 cutáneas (52,2%)

65 mucosas (47,8%)



GRUPO DE EDAD

0,75% < 5 años

98,5% > 10 años

0,75% no especificado



SEXO

79,4% Masculino

20,6% Feminino

78,5% hombres
a más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **23** municipios

20,6% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

38,8% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. whitmani

L. neivai

L. migonei

L. intermedia



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100% (**3** laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **64%** (**23**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Desoxicolato

Anfotericina B Liposomal