

PARAGUAY

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **3,73**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Bajo**

Ocurrencia

92

NUEVOS CASOS

30 cutáneas (32,6%)

62 mucosas (67,4%)

ICLTc trienio* (2015-2017)



*El MS reportó 01 caso desde municipio desconocido que no fue incluido en el cálculo del índice compuesto de leishmaniasis.



GRUPO DE EDAD

0% < 5 años
0% ≥ 5 < 10 años
100% > 10 años

0% niños menores de 10 años



SEXO

79,3% Masculino
20,7% Femenino

79,3% hombres a más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con 3 países en 22 municipios

30,4% de los casos en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

38,4% de la población en zonas de transmisión

Disminución del % de LC en menores de 10 años en comparación a la línea de base del 2012-2015 (Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. whitmani
L. neivai
L. migonei
L. intermedia



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio: **100%**

Cura clínica: **83,7%**

% Pacientes curados entre los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de Meglumina

Anfotericina B Desoxicolato

Anfotericina B Liposomal